



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Vilafranca del Penedès

Avís del 18 de juny de 2021

21/2021

Vinya i fruiters

Les pluges d'ahir no van arribar al Penedès. Només destaquen 9,8 l/m² a Font-rubí, 6,5 a La Bisbal del Penedès i 5,4 a La Llacuna. A la resta d'estacions les quantitats recollides han estat inferiors als 3 l/m².

Vinya

Xarxa d'Avisos Antimíldiu

El risc d'infecció de míldiu és baix, per la qual cosa no es recomana realitzar cap tractament antimíldiu.

Corc del raïm

Franja costanera: Vilanova, El Vendrell, etc.

Ens trobem en període de posta de segona generació.

Zona central de l'Alt Penedès.

S'ha iniciat el vol de la segona generació del corc, ja pot aplicar-se el producte fenoxicarb

Els productes recomanats pel seu control tenen els següents moments d'aplicació:

Moment d'aplicació	Matèria activa	Producte – Casa comercial
Abans de l'inici de cada vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il- acetat (feromona líquida)	SUBVERT - Sutterra
Inici del vol	Fenoxicarb	INSEGAR – Syngenta
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol	CORAGEN - FMC
	Indoxacarb	STEWARD – FMC EXPLICIT – FMC SINDOXA - Sharda
	Bacillus thuringiensis *	Producte comú
Inici d'eclosió	Spinetoram	RADIANT - Dow
	Spinosad *	SPINTOR – Dow
	Tebufenocide	MIMIC – Nisso

*: Autoritzat en agricultura ecològica

Malura o cendrosa

Als llocs més avançats i a les varietats més sensibles, tracteu si observeu presència de malura als raïms.

Per a les zones més tardanes, que encara es troben en floració, es recorda que és un moment de la fenologia que és important protegir.

Avisos de vinya per WhatsApp

Si voleu rebre els avisos de l'Estació d'Avisos de Vilafranca del Penedès per WhatsApp, ho podeu sol·licitar omplint el següent **Formulari d'inscripció**

IMPORTANT: Per rebre correctament els missatges cal afegir a la vostra agenda de contactes el número de telèfon 692 084 101.

Presseguer i nectarina

Ceratitis o mosca de la fruita

Per qui utilitzi la tècnica de la captura massiva, ja poden instal·lar-se els mosquers a les finques. De moment encara no s'han iniciat els vols.

Oidi

El període de sensibilitat del fruit a aquesta malaltia va entre la caiguda del collarí i l'enduriment del pinyol. Cal tenir-ho en compte en aquelles varietats més sensibles i als camps amb antecedents. Es recomana alternar les famílies químiques dels productes que utilitzeu, per tal de prevenir l'aparició de resistències.

Informació elaborada amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

Informació facilitada per l'informador automàtic de Vilafranca del Penedès (93 890 06 59)

Plaça Àgora, s/n. 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 05 34

sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest servei, respongueu aquest correu indicant BAIXA.